

엠폭스 예방접종 안내

엠폭스로부터 확실하고 안정적인 보호를 받기 위해서는 2회 접종을 마치는 것이 중요합니다

접종 대상

해외 체류자 및 고위험군

- 엠폭스 노출 위험 국가·지역에 방문·거주하며 활동하는 과정에서 노출이 예상되는 사람
- 18세 이상 감염위험이 높은 고위험군

의료진 등

- 엠폭스 환자(의심환자 포함)와 접촉하는 의료진
- 엠폭스 진단검사 관련 실험실 요원 및 역학조사관 등

엠폭스 환자의 접촉자로 분류된 경우에도 접종 대상이 될 수 있으며, 이런 경우에는 관할 보건소에서 개별 안내

접종 방법

- 피내 또는 피하 접종으로 **총 2회** 접종
- 과거 접종력이 없으면 **4주 간격으로 2회** 접종
- 과거 두창 백신을 1회 접종했다면 **1회**만 접종

접종 간격 및 부위

- 접종 간격은 **4주**
- 피내접종은 상완(삼각근), 손바닥과 연결된 전완, 건갑골 아래 위쪽 등부위, 피하접종은 상완

접종할 수 없습니다

- 이전 3세대 백신 접종에서 심한 알레르기 반응 (예: 아나필락시스)이 있었던 경우
- 백신 구성성분 또는 미량 성분*에 생명을 위협하는 심각한 알레르기 반응이 있었던 경우

의사와 상담 후 결정합니다

- 고열이 있으면 증상이 호전될 때까지 연기
- 아토피피부염이 있는 경우
- HIV 감염 등 면역체계를 약화시킬 수 있는 상태이거나 치료 중인 경우
- 최근 복용한 약이 있거나 다른 예방접종을 받은 경우
- 임신 중이거나 모유수유 중인 경우
- 켈로이드 흉터가 있으면 피하접종

* 백신 구성성분 chick-embryo cells, trometamol, sodium chloride, water for injections / 백신에 매우 소량 존재할 수 있는 성분 chicken protein, benzonase, gentamicin, ciprofloxacin

1 사전 예약

예방접종도우미 누리집
(엠폭스 예방접종 사전예약):
<https://nip.kdca.go.kr>

2 방문 접종

신분증을 지참하고 예약한
시간에 보건소 또는 접종
의료기관 방문

3 접종 후 관찰

20~30분간 머무르며 이상반응
발생 여부를 확인한 뒤
귀가합니다.